



Guajará-Mirim, 18 de fevereiro de 2021.

**PLANO DE EXECUÇÃO DA IMUNIZAÇÃO COVID-19 SEGUNDA DOSE PARA TRABALHADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E HOSPITAL BOM PASTOR QUE FORAM IMUNIZADOS NA PRIMEIRA FASE NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM – NUVEPA.**

**+ Imunização dos trabalhadores de saúde da Atenção Básica**

A segunda dose (D2) da vacinação iniciará no dia 22 de fevereiro do presente ano, a partir das 14h00min às 17h30min. A vacinação ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) citadas logo abaixo, bem como o Hospital Bom Pastor que serão vacinados *in loco*.

UBS	DATA D1	QUANT. VACINADOS	DATA D2
Carlos Chagas	25/01/2021	44	22/02/2021
Delta Oliveira Martins	25/01/2021	27	22/02/2021
Irmã Maria Agostinho	25/01/2021	28	22/02/2021
Sandoval Meira	25/01/2021	24	22/02/2021
<b>TOTAL:</b>		<b>123</b>	

D1\*: Primeira Dose

D2\*: Segunda Dose

a) Hospital Bom Pastor:

Data da D1: **26/01/2021.**

Quantidade de Vacinados: **26.**

Data da D2: **22/02/2021.**

Horário: 08h00min às 12h00min

14h00min às 17h30min

**+ Trabalhadores da Atenção Básica**

A vacinação iniciará no dia 22 de fevereiro do presente ano, a partir das 14h00min às 17h30min. O local da segunda dose da vacinação ocorrerá nas dependências de cada Unidade Básica de Saúde citada anteriormente, de forma simultânea.



Neste primeiro momento, a previsão de trabalhadores da Atenção Básica a serem vacinados é de 149 pessoas, sendo: 123 trabalhadores das Unidades Básicas de Saúde e 26 trabalhadores da saúde do Hospital Bom Pastor, totalizando assim: 149 servidores.

### **+ Fica organizado da seguinte maneira o processo da imunização:**

A coleta de informações sobre pessoas à serem vacinadas, baseiam no controle de vacinados na primeira dose, ocorrido no dia 25 e 26 de janeiro do presente ano.

### **+ Dentro de cada Unidade Básica de Saúde a organização para a vacinação dos trabalhadores da saúde segue da seguinte maneira:**

1. Cada UBS será composta por 01 vacinador e 01 registrador;
2. Antes da vacinação a ficha deverá ser preenchida com nome, data de nascimento, CPF, cartão do SUS, nome da mãe, lote da vacina e nome da vacina;
3. É importante manter a organização das cadeiras com 1m de distância e que todos os trabalhadores da saúde estejam com as suas máscaras. O não uso da mesma impede adentrar no local, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária;
4. Vacina disponível é CoronaVac (Butantan).

### **+ APRESENTAÇÃO:**

Suspensão injetável.

#### **APRESENTAÇÃO MONODOSE:**

1. Cartucho com 40 frascos-ampola com uma dose de 0,5 mL contendo 600 SU do antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2 cada;
2. Via intramuscular.

### **+ CONTRAINDICAÇÕES:**

Em caso de qualquer uma das seguintes condições, o uso da vacina adsorvida covid-19 (inativada) é contraindicado:



1. Alergia a qualquer um dos componentes desta vacina (hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato dissódico, di-hidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis e hidróxido de sódio para ajuste de pH);
2. Pacientes com febre, doença aguda e início agudo de doenças crônicas.

### **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:**

1. A apresentação monodose deve ser administrada imediatamente após a abertura do frasco;
2. O uso com cautela deve ser feito nos seguintes casos: histórico familiar e pessoal de convulsão, portadores de doenças crônicas, história de epilepsia e alergias;
3. Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com esta vacina com pelo menos um mês de intervalo, de forma a não interferir na resposta imunológica;
4. Medicamentos apropriados, como adrenalina, devem estar prontamente disponíveis para uso imediato em caso de reação anafilática grave após a vacinação. Os pacientes devem ser observados pelo menos 30 minutos no local após a administração.

A vacinação deve ser avaliada com atenção em portadores de desordens neurológicas em atividade.

### **MODO DE USAR:**

**O ESQUEMA DE IMUNIZAÇÃO É DE 02 DOSES DE 0,5 ML  
COM INTERVALO DE 2-4 SEMANAS ENTRE AS DOSES.**

### **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**

1. Não existe informação sobre intercambialidade da vacina adsorvida COVID-19 (inativada) com outras vacinas que produzam resposta imune contra o SARS-CoV-2.



Informações sobre apresentação, contraindicação, advertências e precauções, interações e modo de usar, foram retiradas da bula vacina CoronaVac (BUTANTAN).

Os sintomas: **febre, cefaleia, sintomas gripais** e os diagnósticos de COVID-19 há menos de 30 dias e aquelas pessoas que tiveram COVID-19 há mais de 30 dias, mas que perduram algumas queixas **NÃO É INDICADO A VACINAÇÃO, pois diante de um evento adverso pós-vacinal é necessário diferenciar se aquele sintoma já existia ou se passou a existir após a aplicação da vacina. A resistência vacinal vem existindo, não só em relação à imunização contra COVID-19, e nós como profissionais de saúde precisamos passar orientações claras e retirar as dúvidas da população.**

### **✚ VACINAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE GUAJARÁ-MIRIM/RO E HOSPITAL BOM PASTOR**

Trabalhadores dos serviços de saúde públicos atuando na linha de frente, envolvidos diretamente com casos suspeitos e confirmados de COVID – 19 deverão ser vacinados no período e local citado anteriormente.

As categorias de trabalhadores que se encaixam são: enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, limpeza, manutenção, motorista, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos auxiliares, médicos. **As demais informações sobre o cronograma de vacinação de idosos com idade menor que 80 anos serão divulgados posteriormente.**

Diretora do NUVEPA  
Jocilene Pinheiro Barros  
Decreto n.º 13.097/GAB-PREF/2021

**Jocilene Pinheiro Barros**  
Diretora do NUVEPA  
Decreto nº13.097/Gab-Pref/2021

**Rafael Ripke Tadeu Rablo**  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº13.063/Gab-Pref/2021